



Global Conference on Medical and Health Sciences

Hosted Online from Madrid, Spain

Date: 14th June, 2026

Website: <https://econferencia.com>

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ГАСТРЭКТОМИИ ПРИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА

А. Х. Меликулов

М. Д. Жураев

Самаркандский филиал Республиканского Специализированного
Научно практического медицинского центра Онкологии и Радиологии

Цель исследования: Оценить непосредственные результаты комбинированных гастрэктомий с дистальной гемипанкреатэктомией со спленэктомией при местнораспространенном раке желудка.

Материал и методы: Нами изучены непосредственные результаты хирургического лечения местнораспространенного рака желудка у 17 больных подвергшихся комбинированной гастрэктомии с дистальной гемипанкреатэктомией со спленэктомией за периода с сентября 2017 года по июль месяца 2019 года в отделении Торакоабдоминальной хирургии Самаркандского филиала РСНПМЦОиР. Большую часть оперированных больных составили мужчины – 11 (64,7%). При распределения больных по возрасту, основную массу составили лица 50-70 лет. По гистологической структуре опухоли – аденокарцинома различной дифференциации была у 12 (70,6 %), скirroзный рак у 2 (11,7%), перстневидно клеточный рак у 3 (17,7 %) больных. Все больные в дооперационном периоде прошли обследование согласно стандарту диагностики. По локализации опухоли в желудке у 12 (70,6%) больных первичная опухоль локализовалась в теле и проксимальном отделе желудка с прорастанием в хвостовую часть поджелудочной железы, а у 5 (29,4%) больных тотальное поражение желудка с прорастанием частично в тело и хвостовую часть поджелудочной железы. Все прооперированные больные соответствовали по стадиям $T_{4b}N_{0-2}M_0$. У всех больных в динамике отмечалось желудочное кровотечение различной интенсивности, что было показанием к проведению



Global Conference on Medical and Health Sciences

Hosted Online from Madrid, Spain

Date: 14th June, 2026

Website: <https://econferencia.com>

оперативного вмешательства без проведения неадьювантной химиотерапию.

Результаты: У 17 больных после лапаротомии произведена ревизия брюшной полости и исключена диссеминация и концерматоз и произведения комбинированной гастрэктомии. Количество послеоперационных осложнений после комбинированной гастрэктомии с дистальной гемипанкреатэктомией со спленэктомией наблюдалось у 5 х (29,4%) больных. Из хирургических осложнений у 1 (5,9%) больного отмечена тромбоэмболия легочной артерии, в 1 (5,9%) случае развился панкреатический свищ который закрылся самостоятельно в течение 4 х недель и у 1 (5,9%) больного до операционном периоде диагностировано хронический панкреатит из-за этого у больного через 2 месяца после операции наблюдался сахарный диабет. Терапевтические осложнение были представлены в виде бронхопневмонии и нарушения сердечного ритма у 2 х (11,8%) больных. В обоих случаях осложнения были ликвидированы консервативным лечением. Так, после комбинированной гастрэктомии с дистальной гемипанкреатэктомией со спленэктомией из-за тромбоэмболий легочной артерии умер 1 (5,9%) больной из всех оперированных. Послеоперационная летальность составила 5,9%.

Вывод: Комбинированная гастрэктомия с дистальной гемипанкреатэктомией со спленэктомией обеспечивает радикальности хирургического лечения при местном распространенном раке желудка и свою очередь уменьшает послеоперационных рецидивирования и тем самым улучшает отдалённые результаты и выживаемости.